CE 2797 UK CA 0086

ConvaTec

Flexi-Seal™ PROTECT

Faecal Management System / Stuhlmanagementsystem / Sistema di gestione dell'incontinenza fecale / Système de prise en charge de matières fécales / Sistema de control fecal / Sistema de control fecal / Fækalkatetersystem / Ulosteenhallintajärjestelmä / Fekalkatetersystem / Fekalkatetersystem / Fecaal managementsysteem / Система за управление на фекалните / Sistem za upravljanje z blatom / Systém na odvádzanie stolice / Széklетürtétek szabályozó rendszer / Systém na odvod tekuté a polotekuté stolice / Väljaheite kogumiskomplekt / Sustav za zbrinjavanje fecesa / System do kontrolowanej zbiórki stolca / Fēču savākšanas sistēma / Fekalilų tvarkymo sistema / Sistemul de Management al fecalelor / Fekal Yönetim Sistemi / Σύστημα διαχείρισης κοπράνων / أ ار ا ب جهاز التحكم

Directions for use / Anwendungshinweise / Indicazioni per l'uso / Mode d'emploi / Instructions de use / Instruções de utilização / Brugsanvisning / Käyttöohjeet / Bruksanvisning / Användningsinstruktioner / Gebruiksaanwijzing / Указания за употреба / Navodila za uporabo / Návod na použitie / Használati utasítás / Pokyny pro použití / Kasutusjuhend / Upute za uputrebu / Wskazówki dotyczące użytkowania / Lietošanas norādījumi / Naudojimo nurodymai / Instrucțiuni de utilizare / Kullanım yönergesi / Οδηγίες χρήσεως / إرشادات الاستعمال



ENGLISH

1. Catheter Irrigation and Medication Port
2. Balloon Inflation Port with 2-Dome Fill Indicator and Cap
3. Sampling Port
4. Catheter
5. Position Indicator Line
6. Low-Pressure Retention Balloon with Finger Pocket
7. Connector
8. Hanging Strap
9. Luer-lock Syringe
10. Collection Bag with Integrated Cap
11. Cinch Clamp

Product Description
The Flexi-Seal™ PROTECT™ Fecal Management System contains:
1 soft catheter tube assembly, 1 Luer-Lock syringe, 1 Privacy bag with filter and 1 cinch clamp (Figure 1)

The soft catheter tube assembly contains the rectum bar for fecal management and a short fecal waste in order to protect the patient's skin and keep the bedding clean. There is a low-pressure retention balloon at the distal end and a connector for attaching the collection bag at the other end. There is a recess under the balloon for the clinician's finger allowing the device to be positioned digitally.

A blue and a white port are attached to the side of the catheter. The white port, marked "c-Flex" is used to inflate the retention balloon after the device has been inserted into the patient's rectum. (Figure 2–3b). This white inflation port is equipped with two fill indicating domes (PROTECT™ indicator domes), green color (i.e., the dome closest to the catheter tubing) and red color (i.e., the dome furthest from the catheter tubing). The green fill indication dome provides a visual indication that the low-pressure retention balloon is filled to its optimal volume. A red-dome fill indicator provides a visual and tactile indication when the balloon over-inflation occurs. A white cap is to close off the white inflation port after the balloon inflation. The blue port, marked "IRRIG./Rx" is used to flush the device if needed and administer medication, if prescribed. (Figure 2–1a). A dark blue sampling port is also present if stool samples are required to be taken by the clinician.

Intended Clinical Benefit
As determined by the available data, the clinical benefits of the Flexi-Seal™ FMS family of products include:
• Containment and diversion of faecal matter
• The enablement of being able to administer medication

Claims
In addition to the safety and performance claims relating to the safe use of the device, performance claims made for the device include:
• A product shelf life of 5 years
• The collection bag shall have 1 litre volume capacity.
• The Collection Bag shall have volume graduation markings ranging from 100 ml to 1,000 ml with an accuracy of ± 15%.

Indications
For use to manage fecal incontinence through the collection of liquid to semi-liquid stool and to provide access to administer medications.

Contraindications
1. This product is not intended for use
• for more than 29 consecutive days
• for pediatric patients (patients under 18 years of age) as its use has not been tested in this population

2. The Flexi-Seal™ PROTECT™ Fecal Management System should not be used on individuals who
• have suspected or confirmed rectal/anal mucosal impairment, i.e. severe proctitis, ischemic proctitis, mucosal ulcerations
• have had rectal surgery within the last year
• have any rectal or anal injury
• have hemorrhoids of significant size and/or symptoms
• have a rectal or anal stricture or stenosis
• have a suspected or confirmed rectal/anal tumor
• have any or history of rectal or anal device (e.g. thermometer) or delivery mechanism (e.g. suppositories or enemas) in place
• are sensitive to or who have had an allergic reaction to any component within the system

Warnings
• **Warning:** Clinicians should be aware that there are very limited clinical data on the use of in-dwelling fecal management systems after 14 days continued use.
• **Warning:** There is a potential risk of misconnections with connectors from other healthcare applications, such as intravenous equipment, breathing and driving gas systems, urethral/ urinary, limb cuff inflation mechanical devices and other enteral connectors.
• **Warning:** Not following these instructions for use may increase the likelihood of an adverse event.
• **Warning:** Patients should be monitored daily and a physician notified immediately if any of the following occur
- Rectal pain
- Rectal bleeding
- Abnormal symptoms such as distension/pain
• **Warning:** Over inflation of the retention balloon has the potential to increase the risk of adverse events including rectal pain, bleeding, ulcerations, and possible perforations.
• **Warning:** There is a danger of fecal obstructions (ileus).

Precautions and observations
1. Once attached to the catheter and used for the use of the device in patients who have inflammatory bowel conditions or who have had rectal surgery. The physician should determine the degree and location of inflammation or extent of surgery (e.g. location of anastomosis) within the colon/rectum prior to considering use of this device in patients with such conditions.
2. Care should be exercised in using this device in patients who have a tendency to bleed from either anti-coagulant / antiplatelet therapy or underlying disease. If signs of rectal bleeding occur, remove the device immediately and notify a physician.
3. The device should be used with caution in patients with spinal cord injury because of the possibility of the development of autonomic dysreflexia.
4. Remove any bedding or and device prior to insertion of the Flexi-Seal™ PROTECT™ FMS and do not apply to the rectum while the Flexi-Seal™ PROTECT™ FMS is in place.
5. Ensure that the patient does not lie or sit on the catheter as this could lead to localized pressure damage and contribute to the development of anal skin breakdown and/or rectal flow.
6. Type of soft-formed stool cannot pass through the catheter and will obstruct the opening. The use of the device is not indicated for solid or soft-formed stool.
7. Small amounts of moisture or seepage around the catheter is anticipated. To avoid skin irritation, initiate an appropriate institutional skin care protocol. At a minimum, the skin should be kept clean, dry and protected with a moisture barrier product.
8. If the catheter becomes blocked with feces, it can be rinsed with water using the irrigation port only (see Direction for Use "Irrigation of the Device"). Do not use the white inflation port (marked "c-Flex") to irrigate. If obstruction of the catheter is due to solid stool, use of the device should be discontinued.
9. Clinicians should take extra care to use the blue irrigation port (marked "IRRIG./Rx" (Figure 7-1a) only when irrigating and delivering medication. DO NOT irrigate or administer medication through the white inflation port (marked "c-Flex" Figure 7-1b) which is closed off with a white cap.
10. Discontinue the use of the device if the patient's bowel control, consistency and frequency of bowel movements return to normal.
11. As long as the patient is regularly and closely monitored at all times, patients may be seated for short periods i.e. for up to 2 hours, as part of daily nursing care. During this period of seating, regular monitoring should be made to ensure the balloon is not kinked and to check for and avoid pressure damage to the anal/peri-anal region. See Balloon deflation instructions.
12. As with the use of any rectal device, the following adverse events could occur:
• Leakage of stool around the device
• Rectal/anal bleeding due to pressure necrosis or ulceration of rectal or anal mucosa
• Peri-anal skin breakdown
• Temporary loss of anal sphincter muscle tone
• Infection
• Bowel obstruction
• Perforation of the bowel
13. This device is for single use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimal for intended use.
14. If there is no flow of stools in a 24hr period then the following actions should occur,
• irrigation (see section 3, Irrigation of the device, in Directions for use)
• removal of the device.
15. If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority. Circumstances in which the user should consult a health care professional
16. After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations.

Directions for use
A. Preparation of device
In addition to the device system, gloves and lubricant will be required.
1. Uphold the length of the catheter to lay it flat on the bed, extending the collection bag toward the foot of the bed.
2. Securely attach the collection bag to the connector at the end of the catheter.

B. Preparation of Patient
1. Position the patient in left side lying position; if unable to tolerate, position the patient so access to the rectum is possible.
2. Remove any in-dwelling or and device prior to insertion of the Flexi-Seal™ PROTECT™ device.
3. Perform a digital rectal exam to evaluate suitability for insertion of device.

C. Insertion of device
1. Remove the white cap from the inflation port. Using the syringe provided, remove the air that is in the balloon by attaching the syringe to the white inflation port (marked "c-Flex") and withdrawing the syringe. Remove the supplied syringe and fill it with 45ml of water or saline and connect the syringe to the white inflation port (marked "c-Flex"). Insert a lubricated gloved finger into the blue finger pocket for digital guidance during device insertion (the finger pocket is located above the position indicator line). (Figure 4) Coat the balloon end of the catheter with lubricant. Grasp the catheter and gently insert the balloon end through the anal sphincter until the balloon is beyond the external orifice and well inside the rectal vault. The finger pocket will help to guide the catheter into the rectum. (Figure 5)
2. Inflate the balloon with up to 45ml of fluid by slowly depressing the syringe plunger. With the insertion finger removed, the green PROTECT™ indication dome will indicate once the balloon has inserted the balloon fluid for the maximum. (Figure 2–3b). Stop inflation once the green dome has signalled optimal fill. Under no circumstances should the balloon be inflated with more than 45ml of fluid. If the green PROTECT™ indication dome indicates at less than 30ml of fluid, withdraw the fluid and reposition the balloon in the rectal vault. After repositioning, fill the balloon as described above. Do not fill with more than 45ml of fluid. The red PROTECT™ indication dome will indicate whether the balloon has received the maximum 45 ml of fluid. If the red PROTECT™ indication dome is fully inflated, assess patient's position, fully deflate the balloon and repeat the balloon inflation process. Stop inflation once green dome has signalled optimal fill.
3. Remove the syringe from the inflation port, and gently pull on the soft catheter to check that the balloon is securely in the rectum and that it is positioned against the rectal floor. (Figure 6). Close the cap on the white inflation port to avoid accidental deflation. Secure the catheter by taping the tube to the patient's leg.
4. Position the length of the flexible catheter along patient's leg avoiding kinks and obstruction. Take note of the position indicator line relative to the patient's anus. Regularly observe changes in the location of the position indicator line as a means to determine movement of the retention balloon in the patient's rectum. This may indicate the need for the balloon or device to be re-positioned. In the event of expulsion of the device, deflate the balloon fully; rinse the balloon end of the catheter and reinsert following the instructions for 'Insertion of Device'. A rectal exam should be conducted prior to re-insertion to verify that no stool is present. If expulsion continues for more than three episodes discontinuation of the device should be considered.
5. Hang the bag by the bead strap on the bedside at a position lower than that of the patient.

D. Irrigation of the Device
1. Irrigate the device, fill the syringe with water at room temperature, attach the syringe to the blue irrigation/medication port (marked "IrriG./Rx" Figure 7-1a) and slowly depress the plunger. Clinicians should take extra care to use the blue irrigation/medication port only when irrigating. Do not irrigate through the white inflation port (marked "c-Flex" Figure 7-1b) as this would lead to over inflation and the over inflation of the retention balloon and the risk of rectal damage. Irrigate if assessment of the device indicates that the device is not functioning of the device. Flushing the device as described above is an optional procedure for use only when needed to maintain the unobstructed flow of stool into the collection bag. If repeated flushing with water does not restore the flow of stool through the catheter, the device should be inspected to ascertain whether a fecal impaction (i.e. pressure from a body part, piece of equipment, or resolution of diarrhea). If no source of obstruction of the device is detected, use of the device should be discontinued.

E. Maintenance of device
Change the collection bag as needed. Discard used bags according to institutional protocol for disposal of medical waste. Observe the device frequently for obstructions from kinks, solid fecal particles or external pressure.
The collection bag measuring type has an accuracy of +/-15% and is for indication purposes only.

F. Administration of Medication (dosage needs to be controlled by physician).
1. Attach the supplied syringe and flush the irrigation line with 10ml of water.
2. Prepare a new syringe with prescribed medication. Position the cinch clamp loosely on the catheter to allow fluid flow. Connect syringe to the blue irrigation/medication port (''IrriG./Rx'' Figure 7-1a) and administer medication. Clinicians should take extra care to use the blue irrigation/medication port only when delivering medication. Do not administer medication through the white inflation port (marked "c-Flex" Figure 7-1b) as this would lead to over inflation and the over inflation of the retention balloon and the risk of rectal damage. Remove the cinch clamp on the catheter to ensure no flow through the catheter is restricted as intended.
3. To ensure delivery of medication into the rectum immediately flush the irrigation line with at least 50ml of water. Tighten the cinch clamp on the catheter to ensure no flow through the catheter (ensure the second notch is engaged; squeeze tightly using forefinger and thumb of both hands to ensure a good seal). Allow the medication to dwell in the rectum for the desired amount of time as dictated by the prescribing physician.
4. Remove the cinch clamp. Attach a new syringe (not supplied) and flush the irrigation line with 10ml of water. Dispose of the syringe according to institutional policy.

G. Sampling
To collect a sample from the catheter, open the dark blue sample port cap. Press the tip of a Luer-clip syringe or catheter syringe through the slit inside of the sampling port to access the interior of the catheter. Withdraw the syringe plunger to collect the sample. Withdraw the syringe and close the dark blue sampling port cap.

H. Removal of Device
To remove the catheter from the rectum, the retention balloon must first be deflated. Remove the white cap from the inflation port. Attach the syringe to the white inflation port (marked "c-Flex") and slowly withdraw all fluid from the retention balloon. (Figure 2–3c).
Disconnect the syringe and discard. Grasp the catheter as close to the patient as possible and slowly remove from the anus. Dispose of the device in accordance with institutional protocol for disposal of medical waste. In the event that the balloon is difficult or impossible to deflate, cut the inflation lumen and drain out the water in the balloon. Do no account should the device be removed from a patient with the balloon still inflated.

General Guidelines
The device may be changed as needed to perform normal patient assessment.
The device is not intended for use for more than 29 consecutive days.
If the product packaging is damaged, do not use.

© 2023 ConvaTec Inc.
*/** indicates trademarks of ConvaTec Inc. ConvaTec, the ConvaTec Logo, Flexi-Seal, the Flexi-Seal Logo are registered trademarks of ConvaTec Inc. in the U.S.

DEUTSCH

1. Port zum Spülen des Katheters/Medikamentenport
2. Inflationsport zum Befüllen des Ballons mit Füllstandanzeige
3. Probenentnahmeport
4. Katheter
5. Positionsanzeige
6. Rückhalteballon mit geringem Druck und Fingertasche
7. Konnektor
8. Schlaufe zum Aufhängen
9. Luer-Lock-Spritze
10. Auffangbeutel mit integrierter Verschlusskappe
11. Katheterklemme

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Stuhlmanagementsystem Flexi-Seal™ PROTECT enthält:
1 Set mit weichem Katheterschlauch, 1 Luer-Lock-Spritze, 1 Privacy-Auffangbeutel mit Filter und 1 Katheterklemme (Abbildung 1)

Zum Stuhlmanagement wird der weiche Katheter in das Rektum eingeführt. Das Set ist, Stuhl aufzunehmen und abzuleiten, um die Haut des Patienten zu schützen und das Bett sauber zu halten. Am distalen Ende befindet sich ein Rückhalteballon mit geringem Druck, am anderen Ende ein Konnektor für den Auffangbeutel. Unter dem Ballon befindet sich eine Fingertasche zum Einführen des Systems durch den Arzt.

An der Seite des Katheters befinden sich ein blauer und ein weißer Port. Der weiße Port mit der Aufschrift „c-Flex" dient zum Füllen des Rückhalteballons nach der Einführung in das Rektum des Patienten (Abbildung 2–3). Dieser weiße Inflationsport verfügt über zwei Füllanzeigekuppeln, d. h., die Kuppe am nächsten beim Katheterschlauch) und eine rote (d. h., die am weitesten vom Katheterschlauch entfernte Kuppe). Die grüne Füllstandsanzeigekuppe zeigt sicht- und fühlbar an, wann der optimale Füllstand des Rückhalteballons mit geringem Druck erreicht ist. Die rote Füllstandsanzeigekuppe zeigt eine Überfüllung des Ballons sicht- und fühlbar an. Eine weiße Kappe dient zum Verschluss des weißen Inflationsports nach dem Befüllen des Ballons. Der blaue Port mit der Aufschrift „IRRIG./Rx" dient zum Spülen des Systems im Bedarfsfall und zur Verabreichung von ggf. verschriebenen Medikamenten (Abbildung 2–1a). Außerdem verfügt das System über einen dunkelblauen Probenentnahmeport zur Entnahme von Stuhlproben durch den Arzt.

Vorgesehener klinischer Nutzen
Wie anhand der verfügbaren Daten ermittelt, hat der Flexi-Seal™ FMS-Produktfamilie folgende klinische Vorteile:
• Aufnahme und Ableitung von Stuhl
• Die Möglichkeit, Medikamente verabreichen zu können

Anforderungen
Zusätzlich zu den Sicherheits- und Leistungsanforderungen in Bezug auf die sichere Verwendung des Produkts umfassen die Leistungsanforderungen für das Produkt:
• 5 Jahre Produktlebensdauer
• Der Auffangbeutel muss ein Fassungsvermögen von 1 Liter haben.
• Der Auffangbeutel muss eine Volumenskala von 100 ml bis 1.000 ml mit einer Genauigkeit von ± 15 % haben.

Indikationen
Für das Management von Stuhlinkontinenz durch Ableitung von flüssigem bis halbfestem Stuhl sowie als Zugang für die Verabreichung von Medikamenten.

Kontraindikationen
1. Dieses Produkt ist nicht vorgesehen für den Gebrauch
• über einen Zeitraum von mehr als 29 aufeinanderfolgenden Tagen,
• bei pädiatrischen Patienten (Patienten unter 18 Jahren), weil seine Anwendung in dieser Altersgruppe nicht geprüft wurde.
2. Das Stuhlmanagementsystem Flexi-Seal™ PROTECT sollte nicht bei Patienten verwendet werden,
• die eine erhöhte Schleimhautdurchlässigkeit vermutet oder bestätigt haben, d. h., schwere Proktitis, ischämische Proktitis, Schleimhautulcerationen),
• bei denen im Verlauf des letzten Jahres eine Rektumoperation durchgeführt wurde,
• die eine Verletzung im Rektum oder Analbereich aufweisen,
• die stark ausgeprägte Hämorrhoiden bzw. die damit verbundenen Beschwerden haben,
• die eine rektale oder anale Verengung oder Stenose aufweisen,
• bei denen ein Rektal- oder Analtumor vermutet oder diagnostiziert wird,
• bei denen ein Instrument (z. B. Thermometer) bzw. ein Produkt zur rektalen/analen Anwendung zum Einsatz kommt (z. B. Zäpfchen oder Klistier),
• die gegenüber einem der Bestandteile des Systems überempfindlich oder allergisch reagieren.

Warnhinweise
• **Warnung:** Ärzte ist aus klinischen Studien nur sehr wenig über die Daueranwendung von Stuhlmanagementsystemen während mehr als 14 Tagen bekannt.
• **Warnung:** Es besteht das Risiko einer Verwechslung mit Konnektoren anderer Medizinprodukte wie Produkten für intravenöse Anwendungen, Atemsystemen, Produkten für urethrale bzw. urinologische, extremale bzw. gastrische Anwendungen.
• **Warnung:** Die Nichtbefolgung dieser Gebrauchsanweisung kann die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Ereignissen erhöhen.
• **Warnung:** Bei folgenden Fällen muss der Patient täglich überwacht und sofort ein Arzt benachrichtigt werden:
- Schmerzen im Rektum
- Rektale Blutungen
- Abnormale Symptome wie Blähungen/Schmerzen
• **Warnung:** In folgenden Fällen muss der Patient täglich überwacht und sofort ein Arzt benachrichtigt werden:
- Schmerzen im Rektum
- Rektale Blutungen
- Abnormale Symptome wie Blähungen/Schmerzen
• **Warnung:** Eine Überfüllung des Rückhalteballons kann das Risiko von unerwünschten Ereignissen wie Rektalschmerzen, Blutungen, Ulcerationen und Perforationen erhöhen. Dazu gehören Schmerzen im Rektum, Blutungen, Ulcerationen und Perforationen.
• **Warnung:** Bei diesem Produkt besteht die Gefahr von Stuhlverstopfungen (Ileus).

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise
1. Bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen oder nach Rektum-OP muss genau geprüft werden, ob das Produkt verwendet werden darf. Bevor die Verwendung des Produkts bei Patienten mit diesen Beeinträchtigungen in Erwägung gezogen wird, muss der Arzt das Ausmaß und die Lokalisierung der Entzündung im Colon/Rektum und den Umfang der Rektum-OP (z. B. Position einer Anastomose) ermitteln.
2. Bei Patienten mit Blutungsneigung aufgrund einer Therapie mit einem Gerinnungshemmer/Thrombozytenaggregationshemmer oder aufgrund einer Grundkrankheit muss das Produkt mit Vorsicht verwendet werden. Bei Anzeichen von rektalem Blutungen ist das System sofort zu entfernen und der Arzt zu benachrichtigen.
3. Wegen der Gefahr einer autonomen Dysreflexie muss das System bei Patienten mit einer Rückenmarksverletzung mit Vorsicht eingesetzt werden.
4. Vor dem Einführen des Flexi-Seal™ PROTECT sind ggf. alle anderen Medizinprodukte (z. B. Einlagen oder andere Produkte) aus dem Analbereich zu entfernen. Während der Verwendung des Stuhlmanagementsystems Flexi-Seal™ PROTECT dürfen keine anderen Produkte in das Rektum eingeführt werden.
5. Sollten Sie sicher sein, dass der Patient nicht auf dem Katheter liegt oder sitzt, da dies zu lokalen Druckschäden beitragen und/oder Störungen der Haut im Analbereich führen bzw. die Stuhlableitung behindern kann.
6. Fester oder halbfester Stuhl kann den Katheter nicht passieren und verstopft die Öffnung. Das Produkt ist nicht für die Verwendung bei festem oder halbfestem Stuhl indiziert.
7. Geringe Mengen an Feuchtigkeit oder Austritt um den Katheter herum sind zu erwarten. Zur Vermeidung von Hautreizungen muss eine an die Pflegeplanung berücksichtigt werden. Die Haut muss mindestens durch eine Feuchtigkeitsbarriere geschützt und sauber und trocken gehalten werden.
8. Wenn Stuhl in den Katheter gelangt, kann dieser durch Spülen mit Wasser – aber nur über den Spülport – mit Wasser gespült werden (siehe Gebrauchsanweisung, „Spülen des Systems"). Verwenden Sie zum Spülen nicht den weißen Inflationsport (mit der Aufschrift „c-Flex"), ist der Katheter durch festen Stuhl verschlossen, darf das System nicht mehr verwendet werden.
9. Beim Spülen und bei der Medikamentengabe ist besonders darauf zu achten, dass ausschließlich der blaue Spülport (mit der Aufschrift „IRRIG./Rx", Abbildung 7-1a) verwendet wird. Verwenden Sie zum Spülen und zur Medikamentengabe nicht den weißen Inflationsport (mit der Aufschrift „c-Flex", Abbildung 7-1b) mit der weißen Kappe.
10. Verwendung Sie das System nur so lange, bis sich die Darmkontinenz des Patienten und die Konsistenz und Häufigkeit des Stuhls wieder normalisiert haben.
11. Im Rahmen der täglichen Pflege und unter der Voraussetzung einer engmaschigen Überwachung darf der Patient für kurze Zeiträume (bis zu 2 Stunden) im Sitzen gelagert werden. Während des Sitzens ist eine regelmäßige Überwachung erforderlich. So kann verhindert werden, dass der Katheter verstopft oder knickt und perianale Hautschäden entstehen. Manche Patienten können nur kurze Zeit im Sitzen verbringen. Die Entscheidung, wie lange ein Patient sitzen kann, obwo dies im Pretanalbereich Druckschäden entstehen, liegt bei der Pflegekraft/dem Arzt.
12. Wie bei anderen Produkten zur rektalen Anwendung können die folgenden unerwünschten Ereignisse eintreten:
• Austritt von Stuhl um das Produkt herum,
• rektale/anale Blutung aufgrund einer Drucknekrose oder Ulceration der rektalen oder analen Schleimhaut,
• Hautschäden im Analbereich,
• vorübergehender Tonusverlust des Sphinktermuskels,
• Infektion,
• Darmverschluss,
• Darmperforation.
13. Dieses Produkt ist zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung kann das Risiko für Infektionen und Kreuzkontaminationen erhöhen und die physikalischen Eigenschaften des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck beeinträchtigen.
14. Fließt innerhalb von 24 Stunden kein Stuhl durch das System, sollten die folgenden Maßnahmen ergriffen werden:
• Spülen (siehe Abschnitt „Spülen des Katheters" in der Gebrauchsanweisung) oder
• Entfernen des Katheters.
15. Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, den dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden. Umstände, unter denen der Benutzer einen Arzt konsultieren sollte.
16. Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß allgemein anerkannter med Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

Gebrauchsanweisung
A. Vorbereitung des Systems
1. Neben dem System werden Handschuhe und Gleitmittel benötigt.
2. Entfalten Sie den Katheter und legen Sie ihn flach auf das Bett, wobei der Auffangbeutel zum Fußende des Bettes weist.
3. Schließen Sen den Auffangbeutel an den Konnektor am Ende des Katheters an (Abbildung 3).

B. Vorbereitung des Patienten
1. Legen Sie den Patienten auf die linke Körperseite. Toleriert der Patient diese Lage nicht, lagern Sie ihn so, dass der Zugang zum Rektum möglich ist.
2. Entfernen Sie vor dem Einführen des Stuhlmanagementsystems Flexi-Seal™ PROTECT ggf. alle anderen Medizinprodukte (Verweilkatheter oder andere Produkte) aus dem Analbereich.
3. Führen Sie eine digital-rektale Untersuchung durch, um festzustellen, ob das Produkt eingeführt werden kann.

C. Einführen des Systems
1. Entfernen Sie die weiße Kappe vom Inflationsport. Ziehen Sie mit der beiliegenden Spritze die Luft aus dem Ballon ab. Dazu setzen Sie die Spritze auf den weißen Inflationsport (mit der Aufschrift „c-Flex") und ziehen den Kolben zurück. Nehmen Sie die Spritze ab und füllen Sie diese mit 45 ml Leitungswasser oder Kochsalzlösung. Setzen Sie die Spritze am weißen Inflationsport des Katheters an. Verwenden Sie Handschuhe und Gleitmittel, und stecken Sie einen Finger in die blaue Fingertasche des Produkts, der bei der Einführung zur Orientierung dient. Die Fingertasche befindet sich über dem Positionsanzeigestrich (Abbildung 4). Tragen Sie Gleitmittel auf das Ballonende des Katheters auf. Umfassen Sie den Katheter und führen Sie das Ballonende vorsichtig durch den Sphinkter ein, bis sich der Ballon hinter der Analöffnung und ziemlich tief im Rektum befindet. Der Finger kann während der Inflation am Ballon im Rektum verbleiben oder herausgezogen werden.
2. Füllen Sie den Ballon durch langsames Drücken des Spritzenkolbens mit höchstens 45 ml Flüssigkeit. Sobald der Finger herausgezogen ist, zeigt die grüne PROTECT-Anzeigekuppe an, wenn der Ballon mit der Maximalmenge Füllflüssigkeit gefüllt ist. Nehmen Sie die Füllung vor, sobald die grüne Füllstandsanzeige eine optimale Füllstand anzeigt. Der Ballon darf unter keinen Umständen mit mehr als 45 ml Flüssigkeit gefüllt werden. Wenn sich die grüne PROTECT-Anzeigekuppe bei weniger als 30 ml Flüssigkeit ausgedehnt, muss die Flüssigkeit entfernt und der Ballon im Rektum neu positioniert werden. Füllen Sie den Ballon nach der Neupositionierung, wie oben beschrieben. Nicht mehr als 45 ml Flüssigkeit einfüllen. Die rote PROTECT-Anzeigekuppe zeigt an, wenn der Ballon mit mehr als dem Maximum von 45 ml Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn die rote PROTECT™-Anzeigekuppe vollständig gefüllt ist, prüfen Sie die Lage des Patienten, entleeren den Ballon ganz und füllen ihn dann nach erneut bis zu einem Füllstand, der zwischen Füllstand anzeigt.
3. Nehmen Sie die Spritze vom Inflationsport ab und ziehen Sie vorsichtig am Katheter, um zu prüfen, ob der Ballon sicher im Rektum sitzt und am Rektalboden anliegt (Abbildung 6). Setzen Sie die Kappe auf den weißen Inflationsport, um Verwechslungen wie die Gabe von Medikamenten oder das Spülen durch den falschen Port zu vermeiden.
4. Legen Sie den Katheter so, dass dieser keine Knicke aufweist und nicht abgeklemmt wird. Achten Sie hier, wo sich der Positionsanzeige zur Verhältnis zum Anus des Patienten befindet. Beobachten Sie Veränderungen der Lage der Positionsmarkierung regelmäßig, um Bewegungen des Rückhaltballons im Rektum des Patienten zu bemerken. Gegebenenfalls muss der Ballon oder das Gerät neu positioniert werden. Falls das System ausgestoßen wird, entleeren Sie den Rückhaltballon vollständig, reinigen den Ballon und führen das System wie im Abschnitt „Einführen des Systems" wieder ein. Ist der rektale Untersuchung muss vor dem Wiedereinführen sichergestellt werden, dass kein Stuhl vorhanden ist. Wird das Produkt mehr als drei Mal ausgestoßen, darf das System nicht mehr zu verwenden.
5. Hängen Sen den Beutel mit dem Befestigungsband am Bett in einer Position auf, die niedriger liegt als der Patient.

D. Spülen des Systems
Zum Spülen des Systems füllen Sie eine Spritze mit Raumtemperatur. Setzen Sie die Spritze auf den blauen Spül-/Medikamentenport (mit der Aufschrift „IRRIG./Rx", Abbildung 7-1a) und drücken Sie langsam den Kolben nach unten. Beim Spülen ist besonders darauf zu achten, dass nur der blaue Spül-/Medikamentenport verwendet wird. Spülen Sie nicht durch den weißen Inflationsport (mit der Aufschrift „c-Flex", Abbildung 7-1b). Dies würde zu einer Überfüllung des Rückhalteballons führen und die Gefahr von Rektalschäden verursachen. Spülen Sie das System, wenn die Untersuchung des Produkts (siehe Abschnitt „Untersuchung des Produkts", Abbildung 7-1b). Dies würde zu einer Überfüllung des Rückhaltballons führen und der Patient würde medikamentös nicht richtig versorgt.
7. Spülen Sie den Spülschlauch sofort mit einer Gesamtdosis von ~ 50 ml Wasser, um das Medikament in das Rektum zu bringen. Ziehen Sie die Klemme am Katheter fest, um den Fluss im Katheter zu unterbrechen (sicherstellen, dass die zweite Kerbe einrastet; mit Zeigefinger und Daumen beider Hände kräftig zusammendrücken, um eine gute Dichtung zu gewährleisten). Lassen Sie das Medikament im Rektum verweilen, so wie vom Arzt verordnet.
8. Entfernen Sie die Katheterklemme. Bringen Sie eine neue Spritze (nicht beiliegend) an und spülen Sie den Spülschlauch mit 10 ml Wasser. Entsorgen Sie die Spritze nach den internen Vorschriften.

E. Probenentnahme
Vor der Entnahme einer Probe öffnen Sie die dunkelblaue Kappe am Probenentnahmeport. Drücken Sie die Spitze einer Spritze mit Luer-Ansatz oder einer Katheterspritze durch den Schlitz im Probenentnahmeport, um in das Innere des Katheters zu gelangen. Ziehen Sie den Kolben der Spritze zurück, um die Probe zu entnehmen. Ziehen Sie die Spritze heraus und setzen Sie die dunkelblaue Kappe wieder auf den Probenentnahmeport.

H. Entfernen des Systems
Um den Katheter aus dem Rektum zu entfernen, muss zuerst der Rückhaltballon entfernt werden. Entfernen Sie die weiße Kappe vom Inflationsport. Setzen Sie die Spritze am weißen Inflationsport (mit der Aufschrift „c-Klein") an und ziehen Sie langsam alle Flüssigkeit aus dem Rückhaltballon (Abbildung 2–3c).
Nehmen Sie die Spritze ab und entsorgen Sie diese. Fassen Sie den Katheter möglichst nahe am Patienten und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Anus. Entsorgen Sie das Produkt nach den internen Vorschriften für die Beseitigung medizinischer Abfälle. Wenn der Ballon nur schwer oder gar nicht entleert werden kann, durchschneiden Sie das Inflationslumen und entleeren das Wasser aus dem Ballon. Das System darf auf keinen Fall bei gefülltem Ballon aus dem Körper des Patienten gezogen werden.

Allgemeine Hinweise
Das Produkt kann für Routineuntersuchungen nach Bedarf gewechselt werden.
Das System ist nicht für die ununterbrochene Verwendung während mehr als 29 Tagen vorgesehen.
Das Produkt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

© 2023 ConvaTec Inc.
™ bezeichnet Marken von ConvaTec Inc. ConvaTec, das ConvaTec-Logo, Flexi-Seal und das Flexi-Seal-Logo sind eingetragene Marken von ConvaTec Inc. in den USA.

ESPAÑOL

1. Puerto de irrigación y administración de medicación del catéter
2. Puerto de inflación del balón de retención con indicador del inflado
3. Puerto para toma de muestras
4. Catéter de sílicona
5. Línea indicadora de posición
6. Balón de retención de baja presión con hendidura digital de inserción
7. Conector
8. Tira de sujeción colgante
9. Jeringa Luer-Lock
10. Bolsa colectora con tapón integrado
11. Pinza de cierre

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sistema de control fecal Flexi-Seal™ PROTECT contiene:
1 catéter de silicona blanda, 1 jeringa luer-lock, 1 bolsa discreta y 1 pinza de cierre (Figura 1)

El catéter de silicona blanda se inserta en el recto para proceder al control y derivación del contenido fecal, con el objetivo de proteger la piel del paciente y mantener la zona limpia y seca. En uno de los extremos dispone de un balón de retención de baja presión y en el otro, un conector para acoplar la bolsa colectora. Hay una hendidura debajo del balón para insertar el dedo del facultativo, permitiendo así la colocación digital del dispositivo.

Hay dos puertos acoplados al catéter de silicona. El puerto de color claro, con la indicación impresa de "c-Klein", es usado para inflar el balón de retención una vez el dispositivo ha sido insertado en el recto del paciente (Figura 2–3b). Este puerto cuenta con dos señales indicadoras PROTECT de fenado, de color verde y rojo respectivamente. La señal verde proporciona una indicación visual cuando el balón ha alcanzado el nivel de relleno de retención de baja presión. La señal roja proporciona una indicación visual y táctil cuando se produce un inflado excesivo. Existe un tapón blanco que permite cerrar el puerto blanco de inflado después de inflar el balón. El puerto de color azul, marcado "IRRIG./Rx", se utiliza para limpiar el dispositivo en caso necesario y administrar medicamentos bajo prescripción (Figura 2–1a). También existe un puerto de muestreo, de color azul oscuro, por si el médico necesita tomar una muestra de las heces.

Beneficios clínicos previstos
Según los datos disponibles, algunos de los beneficios clínicos de la familia de productos Flexi-Seal™ FMS son:
• contención y desvío de las materias fecales
• posibilidad de administración medicación

Características del producto
Además de las características de seguridad y rendimiento relacionadas con el uso seguro del producto, entre las características de rendimiento de este se incluyen:
• Vida útil del producto de 5 años
• La bolsa colectora debe tener una capacidad de 1 litro.
• La bolsa colectora debe tener marcas de graduación de volumen que vayan de 100 ml a 1.000 ml con una precisión de ±15 %.

INDICACIONES
Para su uso en el control fecal de pacientes con escasa o nula control intestinal, a través de la colección de las heces líquidas o semilíquidas, así como para proporcionar un acceso para administrar medicamentos.

CONTRAINDICACIONES
1. Este producto no puede utilizarse:
• durante más de 29 días consecutivos.
• en pacientes pediátricos (pacientes menores de 18 años), ya que su uso no ha sido probado en este rango de población.
2. El sistema de control fecal Flexi-Seal™ PROTECT no debería ser utilizado en personas con:
• sospecha o posible deterioro de la mucosa distal, es decir, proctitis gr

elemlőzése, hogy a cső nincs-e akadályosztva, a katéter nem tört-e meg és hogy nem alakul-e ki nyomási fekély a végtelyhőjuk körül. Nélkülvy betey esetében az ülterés időtartama szükkal rövidebb lell, hogy legyen a nyomási fekély elkerülése érdekében, az orvosok figyelmet fel kell lenni erre a körülményre.
12. Mint bármely vérgyőkben használható vegyületből származhat kockázata a keletkező kvalifikációs eszmények fordulhatnak elő:
• Szokást szivárgás a termék körül
• A végtelyhőjtőkörüli vérzés a végtől vagy végtelyhőjük nyomás hatására bekövetkező elhalása vagy fekélyesedése miatt
• A végtelyhőjük körüli bőr károsodása
• A végtől való izomzatának átmeneti elhalása
• Fertőzés
• Bőrkiütődés
• A bél perforációja
13. A termék egyszer használatos, ismételt felhasználása nem ajánlott. Az ismételt felhasználás hozzájárulhat a fertőzés, keresztszennyeződés kockázatának növekedéséhez. Előfordulhat, hogy a termék fokozatosan elveszíti nem ismételt felhasználásának mértékét, a mindenkori használatnál.
14. Ha a szükért áramlata 24 órás időszakban szünetel, az adózó intézkedéseket vam szükség.
• Időlités tűzol a Használati utasítás „A végtelyhőjük időlítése” című részben, vagy
• a végtelyhőjük eltávolítása.
15. Ha az oxiklór használatát követően vagy klorhexidinben súlyos incidens következik be, azt jelentsen kell a gyártó és a helyileg illetékes állami hatóság felé.

A. Tervezés és működés

Ez a Flexi-Seal™ PROTECT egy olyan rendszer, amely a katéter nem tömítő részét és a végtelyhőjük körüli területet figyeli. Ha a végtelyhőjük körüli területen szivárgás észlelhető, a rendszer figyelmeztető jelzést küld a gondozónak, hogy a katéter cseréjéről gondoskodhasson.

B. Alkalmazási terület

A Flexi-Seal™ PROTECT rendszer olyan felnőtt betegek számára készült, akiknél a végtelyhőjük körüli területen szivárgás észlelhető, és akiknél a végtelyhőjük körüli bőr károsodásának kockázata áll fenn.

C. Ellenjavallatok

A rendszer használata ellenjavallt olyan betegek esetében, akiknél a végtelyhőjük körüli területen szivárgás nem észlelhető, vagy akiknél a végtelyhőjük körüli bőr károsodásának kockázata nem áll fenn.

D. Figyelmeztetések

1. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
2. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
3. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
4. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
5. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
6. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
7. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
8. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
9. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
10. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
11. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
12. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
13. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
14. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
15. A rendszer használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.

E. Használati útmutató

1. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
2. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
3. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
4. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
5. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
6. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
7. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
8. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
9. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
10. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
11. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
12. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
13. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
14. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.
15. Olvassa el az összes figyelmeztetést és óvintézkedést.

F. Tárolási körülmények

1. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
2. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
3. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
4. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
5. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
6. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
7. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
8. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
9. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
10. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
11. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
12. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
13. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
14. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.
15. Tárolja a terméket a gyártó által megadott hőmérsékleti tartományban.

G. Karbantartás

1. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
2. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
3. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
4. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
5. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
6. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
7. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
8. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
9. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
10. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
11. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
12. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
13. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
14. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.
15. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy felnyílt.

H. Ártalmatlanítás

1. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
2. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
3. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
4. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
5. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
6. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
7. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
8. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
9. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
10. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
11. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
12. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
13. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
14. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.
15. A használt termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.

I. Garancia

1. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
2. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
3. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
4. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
5. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
6. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
7. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
8. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
9. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
10. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
11. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
12. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
13. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
14. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
15. A garancia nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.

J. Jótállás

1. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
2. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
4. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
5. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
6. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
7. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
8. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
9. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
10. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
11. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
12. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
13. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
14. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.
15. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő károkra.

K. Kapcsolat

1. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
2. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
3. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
4. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
5. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
6. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
7. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
8. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
9. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
10. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
11. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
12. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
13. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
14. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.
15. Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.

L. Nyelv

1. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
2. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
3. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
4. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
5. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
6. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
7. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
8. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
9. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
10. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
11. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
12. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
13. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
14. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.
15. A használati utasítás magyar nyelven elérhető.

M. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

N. Csomagolás

1. A csomagolás magyar nyelven van.
2. A csomagolás magyar nyelven van.
3. A csomagolás magyar nyelven van.
4. A csomagolás magyar nyelven van.
5. A csomagolás magyar nyelven van.
6. A csomagolás magyar nyelven van.
7. A csomagolás magyar nyelven van.
8. A csomagolás magyar nyelven van.
9. A csomagolás magyar nyelven van.
10. A csomagolás magyar nyelven van.
11. A csomagolás magyar nyelven van.
12. A csomagolás magyar nyelven van.
13. A csomagolás magyar nyelven van.
14. A csomagolás magyar nyelven van.
15. A csomagolás magyar nyelven van.

O. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

P. Csomagolás

1. A csomagolás magyar nyelven van.
2. A csomagolás magyar nyelven van.
3. A csomagolás magyar nyelven van.
4. A csomagolás magyar nyelven van.
5. A csomagolás magyar nyelven van.
6. A csomagolás magyar nyelven van.
7. A csomagolás magyar nyelven van.
8. A csomagolás magyar nyelven van.
9. A csomagolás magyar nyelven van.
10. A csomagolás magyar nyelven van.
11. A csomagolás magyar nyelven van.
12. A csomagolás magyar nyelven van.
13. A csomagolás magyar nyelven van.
14. A csomagolás magyar nyelven van.
15. A csomagolás magyar nyelven van.

Q. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

R. Csomagolás

1. A csomagolás magyar nyelven van.
2. A csomagolás magyar nyelven van.
3. A csomagolás magyar nyelven van.
4. A csomagolás magyar nyelven van.
5. A csomagolás magyar nyelven van.
6. A csomagolás magyar nyelven van.
7. A csomagolás magyar nyelven van.
8. A csomagolás magyar nyelven van.
9. A csomagolás magyar nyelven van.
10. A csomagolás magyar nyelven van.
11. A csomagolás magyar nyelven van.
12. A csomagolás magyar nyelven van.
13. A csomagolás magyar nyelven van.
14. A csomagolás magyar nyelven van.
15. A csomagolás magyar nyelven van.

S. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

T. Csomagolás

1. A csomagolás magyar nyelven van.
2. A csomagolás magyar nyelven van.
3. A csomagolás magyar nyelven van.
4. A csomagolás magyar nyelven van.
5. A csomagolás magyar nyelven van.
6. A csomagolás magyar nyelven van.
7. A csomagolás magyar nyelven van.
8. A csomagolás magyar nyelven van.
9. A csomagolás magyar nyelven van.
10. A csomagolás magyar nyelven van.
11. A csomagolás magyar nyelven van.
12. A csomagolás magyar nyelven van.
13. A csomagolás magyar nyelven van.
14. A csomagolás magyar nyelven van.
15. A csomagolás magyar nyelven van.

U. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

V. Csomagolás

1. A csomagolás magyar nyelven van.
2. A csomagolás magyar nyelven van.
3. A csomagolás magyar nyelven van.
4. A csomagolás magyar nyelven van.
5. A csomagolás magyar nyelven van.
6. A csomagolás magyar nyelven van.
7. A csomagolás magyar nyelven van.
8. A csomagolás magyar nyelven van.
9. A csomagolás magyar nyelven van.
10. A csomagolás magyar nyelven van.
11. A csomagolás magyar nyelven van.
12. A csomagolás magyar nyelven van.
13. A csomagolás magyar nyelven van.
14. A csomagolás magyar nyelven van.
15. A csomagolás magyar nyelven van.

W. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

X. Csomagolás

1. A csomagolás magyar nyelven van.
2. A csomagolás magyar nyelven van.
3. A csomagolás magyar nyelven van.
4. A csomagolás magyar nyelven van.
5. A csomagolás magyar nyelven van.
6. A csomagolás magyar nyelven van.
7. A csomagolás magyar nyelven van.
8. A csomagolás magyar nyelven van.
9. A csomagolás magyar nyelven van.
10. A csomagolás magyar nyelven van.
11. A csomagolás magyar nyelven van.
12. A csomagolás magyar nyelven van.
13. A csomagolás magyar nyelven van.
14. A csomagolás magyar nyelven van.
15. A csomagolás magyar nyelven van.

Y. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

Z. Csomagolás

1. A csomagolás magyar nyelven van.
2. A csomagolás magyar nyelven van.
3. A csomagolás magyar nyelven van.
4. A csomagolás magyar nyelven van.
5. A csomagolás magyar nyelven van.
6. A csomagolás magyar nyelven van.
7. A csomagolás magyar nyelven van.
8. A csomagolás magyar nyelven van.
9. A csomagolás magyar nyelven van.
10. A csomagolás magyar nyelven van.
11. A csomagolás magyar nyelven van.
12. A csomagolás magyar nyelven van.
13. A csomagolás magyar nyelven van.
14. A csomagolás magyar nyelven van.
15. A csomagolás magyar nyelven van.

AA. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AB. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AC. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AD. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AE. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AF. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AG. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AH. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AI. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AJ. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AK. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AL. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AM. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AN. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AO. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AP. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AQ. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AR. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AS. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AT. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AU. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AV. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AW. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AX. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AY. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

AZ. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

BA. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

BB. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

BC. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven van.
7. A címke magyar nyelven van.
8. A címke magyar nyelven van.
9. A címke magyar nyelven van.
10. A címke magyar nyelven van.
11. A címke magyar nyelven van.
12. A címke magyar nyelven van.
13. A címke magyar nyelven van.
14. A címke magyar nyelven van.
15. A címke magyar nyelven van.

BD. Címke

1. A címke magyar nyelven van.
2. A címke magyar nyelven van.
3. A címke magyar nyelven van.
4. A címke magyar nyelven van.
5. A címke magyar nyelven van.
6. A címke magyar nyelven