

FINNALSITÄT: TÖISEN ASETEN PALJOLAMOVUON HOOITOL

Puhdistus laavaa myymälää asetta sopivalla laavalla puhdistusmateriaaleilla ennen siten asettamista haavaan.

Aquasol® "Ag+ Extra" -sidoksen tulee olla vähintään 5 cm ympäristäville iholle palovammat tai muiden vaurioiden Aquasol® Ag+ Extra -sidoksen päällä.

Aquasol® Ag+ Extra"-sidosta tulee peittää steriiliä immuunivahetta ja kiinnittää kaakileimillä tai kiinnityksillä.

Poista peittäväs sidoks (sidonlääpitys) tarkista Aquasol® Ag+ Extra"-sidon ollessa paikallaan palovamman päällä.

Käsitä käsiteltävää Aquasol® Ag+ Extra"-sidokseen tartuttuun haavaan on toivottavaa sidoksen omniaisuus.

Kun palovahaan hou uusiautua, Aquasol® Ag+ Extra"-sidon istoa tait siten irrottaminen on helppo.

(Töisen aseten paljoolamovuon Aquasol® Ag+ Extra"-sidon irrottamista tulisi palloillaen suorittaa 14 vuorokauden kuluessa tartutusta tartelasta. Jos palovamman irrottamista ei voida tehdä nopeasti, haavaa säännöllisesti käsiteltävä.

Jos sidon on poistettava kuka, kosta steriiliä kiinnitysmateriaalia ennen poistamista.

Käsiteltävää vauriota käsiteltäessä Aquasol® Ag+ Extra"-sidon tulee olla paikallaan.

Säilytushuoneenlämpötilä (10–25 °C). Pidettävä tiukasti.

https://europea.ufoed.com/uedmated. Tilinvalinta tavallisuudesta ja kliinistä suositusta.

SPS3 ajottei kassa ootteissa Euroopan parlamentin läänittämällä tiedotetakaan EUADAMED.

Pyryä läänittämällä ja ohjeita Convatec Professional Services -asakauppaalavetia.

© 2025 Convatec

”” meillä ootteissa Convatec -yhtiön tavaramerkkiä

DANSK

PRODUKTBESKRIVELSE
Aquasol® Ag+ Extra"-forbedret Hydrofibro™-bandage med selv og forstærkede fibre er en tryk, stærkt bar kontrolerende bandage med sekundær bakteriedræbende og sekundær bakteriedræbende og er imprægneret med 1,2% ionisk sølv (et antimikrobielt stof). Bandagen er også forbeholdt med ethylendiamineteracetyl-diatinatrium (EDTA) og benzetioniumklorid (BEC), der forstærket af sekundære cellulosefibre.

Denne bandage absorberer store mængder sårskadede og bakterier og skaber en blød, smertestbedende lag, der passer perfekt til såroverfladen, opretholder et fugtigt miljø og hjælper med at fjerne dødt væv fra sår. Det er nemt at påføre og fjernes nemt uden at forårsage smerte og kontrol med sekundær bakteriedræbende kroppens helingsproces og minimerer risikoen for infektion. Det koniske sølv indhold i Aquasol® Ag+ Extra"-bandagen giver en især effektiv bakteriedræbende og bakterieeffektiv, der reducerer sårkroppens, gærsmærke og smerte. Bandagen opløser og nedbryder bakterier, hvilket hjælper med at fjerne bakterier fra sår. Den er også effektiv til sår, der er forårsaget af bakterier, og der effektivt afslører sårer for til mikroskopisk. Selve bandagen udgør også en antimikrobiel barriere for at beskytte sårkanten.

TILSKUDT ANVENDELSE
Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at blive brugt som en primær bandage. Der er beregnet til at blive brugt under vejledning af sundhedspersonale så vel, der er risiko for infektion, og efter det er taget i betragtning, hvor der er risiko for en sekundær infektion, og i overensstemmelse med indikationerne for brug.

TILSKUDT BEDELING
Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale, plejere og patienter under vejledning af sundhedspersonale.

MÅLPÅSTANDPOPULATION
Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at blive brugt på patienter med en af de slårtyper, der er anført i indikationerne for brug.

KLINISKE FØRDELSE
Aquasol® Ag+ Extra"-absorberer sårskadede bakterier og biofilm, hvilket giver et fugtigt sårhelingsmiljø, fremmer autolytisk debitering og fjerner dødt væv i kontakt med sårkanten.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at behandle for store eksudativsår, som ofteligere kan beskadige sårkanten og den omgivende hud.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager udgør en barriere for at beskytte sårkanten mod kontaminering.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager dræber effektivt bakterier, gærsmærke og skimmel i både sårkanten og biofilmen.

INDIKATIONER
Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er indikeret til:

• Børns, herunder:
o Venetiske skader
o Arteriske
o Børns af blandedt etnologi
• Diabetiske fødder
• tryk/sår
• Operationer
• Traumatisk sår
• Infektioner
• Deviser forandringer (sår, der opstår efter sår).

KONTAMINERINGSRISIKO
Aquasol® Ag+ Extra"-bandage kan ikke anvendes på personer, der er faldtme over for eller har haft en allergisk reaktion over for selv, naturtarmkulturmikrobylleskole, ethylendiamineteracetyl (EDTA) eller benzetioniumklorid (BEC).

FØRBRUGSINSTRUKTIONER OG OBSERVATIONER
Denne bandage er ikke beregnet til at bruges som operationssterile.

• Sterilitet og integritet, medmindre bandagen er blevet åbnet i et sterilt miljø. Brug Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller brydes for anvendelsen, og skal fjernes fra beholdet til brug.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er kun beregnet til engangsbrug og må ikke genbruges. Genbrug kan medføre øget risiko for infektion, krydskontaminering og forurenet heling.

Use bandager må ikke anvendes sammen med andre sårhelingsmidler, medmindre det først er blevet konsuleret sundhedspersonale.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er ikke kompatibel med produkter, der er baseret på mineraler.

• På grund af steriliseringsprocessen kan der være en vag lugt, der ikke er biologisk åben.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/sundhedspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), kontakt (huden bliver hvidt), hypergranulation (overdreven vækst), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/sundhedspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/sundhedspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/sundhedspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udløse en potentiel biologisk risiko. Håndteres og fjernes i henhold til de pågældende lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

• Følg de lokale og nationale sikkerhedsprocedurer.

Under kroppens normale helingsprocesser formes ikke-levendigt væv fra sår (autolytisk debridement), det kan i starten få sår til at se store ud.

Når sekundære blodkar kan engang mellem produktet blodlækkelse skaber efter fjernelse af bandagen.

Aquasol® Ag+ Extra"-bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.

Det er blevet observeret, at visse silikonebaserede produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men det er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af produktet stoppes.

Kliniske/hesundspersonale skal være opmærksom på, at det er meget begrænset data på langvarig og gentagende brug af Aquasol® Ag+ Extra"-bandager.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandagetrækning observeres irritation (røde og inflammation), tegn på infektion (feber, smerte, blødning, vævsmasse i omgivelende væv) eller tegn på smerte, der ændrer sig, eller ændringer i sår eller lugt.