

indtil den læser sig. (Se kapitlet BRUGSANVISING, for behandling af dehudbrandskader). Ettersom AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage damer et fugtig miljø, som fremmer vekst af nye blodkar, kan de skrellelige, nydannede blodkar lejlighedsvis give blodblødninger såkaldte.

- AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage må ikke anvendes sammen med oliebaserede produkter såsom vaseline.
- BRUGSANVISINGEN er kun valgt til sekundærbehandling.
- Hvis bestandens bestandeforandringer bør iærkeskastes, hvor det er indikeret (f.eks. brug af graduert kompression i behandlingen af venese legår eller trykklæstning i behandlingen af dehudbrandskader), skal de iærkeskastes efter brug af AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage med en kombination til de vedrørende langvarig og gentagen brug af selvhelbredende produkter, særligt hos børn og nyfødte.

BRUGSANVISING

• Rengør såret i henhold til lokale rutiner, før bandagen appliceres.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage skal dække såret med en margin på mindst 1 cm udenfor skåranten.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage anvendes i dybe sår, skår dækkende i kun til 80% da bandagen vil ekspandere og fylde kaviteten ved kontakt med slårskade.

• Det anbefales, at AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage anvendes i kombination med et ikke-klebrigt produkt (f.eks. lakage, kraftig blødgøring, øget smerte) eller efter maksimalt 7 dage.

• En fugtbevarende topbandage som f.eks. en hydrokolloid bandage med selv ille eller moderat selektion.

• Hvis bandagen topbandage som f.eks. en skumbandage eller en gaze til kraftigt væksende sår.

• Til tårne sår, se adnoten "TORRE SÅR" nedenfor.

• Hvis bandagen har fastnet sig til brændskår, skal man sårer, at bandagen forblive på plads, før de omrider, hvor bandagen endnu ikke har fastnet sig, skal bandagen forblive på brændskåret, med mindre det er klinisk indikeret at fjerne bandagen. Der forbandet på bandagen skal det nyfødte forband appliceres over det befalende forbandet som restan stift.

• Hvis bandagen ikke har fastnet sig til brændskår, skal den fernes, hvis bandagen er møttet eller hvis det er lakage, ellers kan bandagen forblive på brændskåret.

VED DEHUDBRANDSKADER (ANDENGRADS):

• Rengør såret i henhold til gældende retningslinjer, før bandagen appliceres.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre skal dække midt i såret, såkaldt "torre sår", og indynde, forstærkede fibre skal dække omkring sårkanten.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre skal dækkes med et sterl, absorbende produkt (f.eks. med nettet bandage AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med 3 cm.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre skal dækkes med et sterl, absorbende produkt (f.eks. med nettet bandage AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre, mens den bliver liggende på såret).

• Hvis bandagen ikke har fastnet sig til brændskår, skal den fernes, hvis bandagen er møttet eller hvis det er lakage, ellers kan bandagen forblive på brændskåret.

• Hvis bandagen er inficeret, kan hyppig inspektion af såret være nødvendigt.

Verdering af bandagens evne til at fastne sig til skårbrænd

AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandagens evne til at fastne sig til brændskår skal inspiceres. Fjern topbandagen og kontroller om bandagen fastner sig til brændskåret.

Hvis bandagen har fastnet sig til brændskår, skal man sårer, at bandagen forblive på plads, før de omrider, hvor bandagen endnu ikke har fastnet sig, skal bandagen forblive på brændskåret, med mindre det er klinisk indikeret at fjerne bandagen. Der forbandet på bandagen skal det nyfødte forband appliceres over det befalende forbandet som restan stift.

Hvis bandagen ikke har fastnet sig til brændskår, skal den fernes, hvis bandagen er møttet eller hvis det er lakage, ellers kan bandagen forblive på brændskåret.

Fjernelse af bandagen

• Efterhånden som brændskåret heler, vil AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre leese sig op nemt kunne fernes.

• Ved behandling af dehudbrandskader (andengradsforbrændinger) må AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre blive liggende i op til 14 dage.

• Hvis brændskåret er inficeret, kan hyppig inspektion af såret være nødvendigt.

TORRE SÅR

• Applicér AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage på skår og fugt kun skårmedt bløddråbe til overholdt fugtigheden i såret og nedsetter risikoen for maceration. Dk bandagen med en fugtbevarende sekundærbehandling, såkaldt DuoDERM™ ExtraThin, for at undgå at bandagen tørrer ud og efterfølgende klæber fast til såret.

Opbevares ved stuetemperatur (10°C – 25°C/50°F – 77°F). Opbevares tørt.

For yderligere information eller vejledning, kontakt venligst ConvaTec Kundeservice.

Den antimikrobielle effekt er påvist in vitro i relevante mikrobiologiske analyser

© 2022 ConvaTec Inc.

*" er varemærket tilhørende ConvaTec Inc.

NORSK

PRODUKTBESKRIVELSE

AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-Bandage med selv og forstærkede fibre er en myk, sterl, non-woven bandage lavet af to lag naturkøllefiber med silikone-lakering indpreget med 1,2% ioniseret sølv (antimikrobielt forstærket, forstærket med etylenediaminetetraacetat (EDTA) og benzimidazolium EDTA) og et hydrokollid forband for at fjerne og fjerne absorberende biofilmen inn i bandagen.

Denne bandage absorberer slårskade og bakterier, samt omdanner til en myk og sammenhengende gel. Gelen bevare i et aktivt skårtilhælingsmiljø som fremmer stifteling. bidrar til å redusere infeksjonsrisikoen og hjelper til med å fjerne såret ved frå såret. Autolytisk, deodoriserende og ikke irriterende. Det senkes sterilt i bandagen drøper patogener mikrobiologisk induktert slårskader, gjennomsir og pussopp, både i dehudbrandskader og i skårbrændskader. AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage er med på å danne et antimikrobielt miljø, og i tillegg bidrar fjerne og forebygger den forbedrede bandagen dannelsen og gjendannelsen av biofilmen i bandagen.

INDIKASJONER

AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-Bandage kan brukes som angitt i BRUGSANVISINGEN for bedring av:

- sår de er effektive barrierer mot bakterier gjennom penetrering av bandagen og dette er med på å redusere infeksjonen.
- med infeksjon eller med et infeksjonsrisiko.
- diabetiske fotter, legår, (venese stasier, arterielle sår og legår med blandet etiologi) og trykklødhud- og fulluldsdiase.
- legårssår.
- sår som lett skår, sår som er blitt medlet med et kirurgisk debridert.
- kirurgiske sår som vasker, skår som tåne fungodes-tumorer, ulcererende karinsier, kutane metastaser, karisk sårkom og angiosarkomer.
- dehudbrandskader (andengrads) og skårbrændskader.
- sår hvor man mistenker at bakterier er årsaken til (eller en medvirkende faktor) kronittet eller manglende tilheling.

KONTRAINSIKASJONER

AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-Bandage skal ikke brukes på personer som er allergiske eller som har hatt en allergisk reaksjon på såkalt naturkøllefibrer/mikrocellulose, EDTA eller benzimidazolium.

FORSIKTIGHETSREGELER OG OBSERVASJONER

Advarsel: Steriltet er garantert med mindre poren er skadet eller åpnet for kontakt med bakterier. Steriltet skal produseres i et sterilt miljø.

Denne enheten er til engangsbruk og skal ikke gjenbrukes. Gjennomsir kan føre til risiko for infeksjon og krysskontaminasjon. Enhets fysiske egenskaper kan kanskje ikke lenge er optimale for tiltenkt bruk.

På grunn av steriliseringsprosessen kan det forekomme luft ved åpningen av den sterle pakeringen.

Hvisder kroppens normale tilhælingsprosess fernes deaktiveres ved frå såret (autolytisk debridement), og dette kan innleivningsvis gi sår et sårst stytter.

Ved bandagering av sårer, skal sårer under eller undermindre sår, ved AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-Sårer før sårer.

Denne bandagen kan klipes til å alle størrelser.

Hvis den har sanitiserende egenskaper, kan den bliets med vann eller sterilt saltvann inntil den løser. (For behandling av dehudbrandskader, se avsnittet for de BRUGSANVISINGEN).

AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-Bandage damer et fugtig miljø som fremmer veksten av nye blodkar, kan skjøre og nydannede blodkar av og til gi blodblødninger såkaldte.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som f.eks. petroleum.

• Det hevses til BRUGSANVISINGEN for valg av sekundærbehandling.

Hvis bestandens bestandeforandringer bør iærkeskastes, hvor det er indikeret (f.eks. bruk av graduert kompresjon i behandlingen av venese leggår eller trykklæstning ved behandling av dehudbrandskader), skal de iærkeskastes etter bruk av AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage med en kombination til de vedrørende langvarig og gentagen bruk av selvhelbredende produkter, særlig hos barn og nyfødte.

BRUGSANVISING

• Rengør såret i henhold til lokale rutiner, før bandagen appliceres.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage skal dække såret med minst 1 cm ut på huden som over sårkanten.

• Hvis AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage brukes i dype sår, skal såret dækkes i op til 80% da AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage vil ekspandere og fylle sårhulen når de kommer i kontakt med slårskade.

• Det anbefales, at AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage anvendes i kombination med et ikke-klebrigt produkt (f.eks. lakage, kraftig blødgøring, øget smerte) eller etter høyst 7 dager.

• En fugtbevarende bandage som for eksempel en hydrokolloid band ved sår med liten eller moderat væksende slårskade.

• Hvis bandagen topbandage som f.eks. en skumbandage, eller en gaze til kraftigt væksende bandage, ved sår med mye slårskade.

• For tårne sår henvises det til avsnittet FOR TORRE SÅR nedenfor.

• Hvis bandagen har fastnet sig til brændskår, skal man sårer, at bandagen forblive på plads, før de omrider, hvor bandagen endnu ikke har fastnet sig, skal bandagen forblive på brændskåret, med mindre det er klinisk indikeret at fjerne bandagen. Der forbandet på bandagen skal det nyfødte forband appliceres over det befalende forbandet som restan stift.

Hvis bandagen ikke har fastnet sig til brændskår, skal den fernes, hvis bandagen er møttet eller hvis det er lakage, ellers kan bandagen forblive på brændskåret.

VED DEHUDBRANDSKADER (ANDENGRADS):

• Rengør såret i henhold til gældende retningslinjer, før bandagen appliceres.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde forstærkede tråder bør dække midt i såret, såkaldt "torre sår", og indynde, forstærkede fibre skal dække omkring sårkanten.

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre skal dækkes med et sterl, absorbende produkt (f.eks. med nettet bandage AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med 3 cm).

• AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandagen med selv og indynde, forstærkede tråder bør dækkes med et sterl, absorbende bandage og fjerne med mediativ te eller en fugtbevarende bandage.

• På de dekkbandagen mens den ligger på plads på brændskåret.

• Hvis bandagen når det er klinisk indikeret (f.eks. mettede bandage, lekkasje, økt smerte) at fjerne bandagen er det ønsket at AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede tråder fester sig til brændskåret som restan stift.

• Hvis bandagen ikke har fastnet sig til brændskåret, skal den fernes, hvis bandagen er møttet eller hvis det er lakage, ellers kan bandagen forblive på brændskåret.

Fjerning av bandagen

Efter hvert som det trykspilende bandaget over brændskåret, vil AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre leese sig opp nemt kunne fernes.

Ved dehudbrandskader (andengradsforbrændinger) kan AQUACEL™ Ag+ EXTRA™-bandage med selv og indynde, forstærkede fibre bli liggende på såret i opptil to uker eller til fjerning er klinisk indikeret.

Hvis brændskåret er inficeret, kan det være nødvendig å etters såret hyppig.

FOR TORRE SÅR

Plasier AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™-Bandage på skår og fukt den med sterilt saltvann kun over skårmedt bløddråbe til overholdt fugtigheden i såret og nedsetter risikoen for maceration. Dk bandagen med en fugtbevarende sekundærbehandling, såkaldt DuoDERM™ Extra Thin, for å unngå at bandagen tørrer ut og etterfølgende fester seg til såret.

Opbevares ved romtemperatur (10°C – 25°C/50°F – 77°F). Opbevares tørt.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon eller veiledning, kontakt ConvaTec Kundeservice.

Den antimikrobielle effekten er påvist i relevante mikrobiologiske analyser in vitro.

© 2022 ConvaTec Inc.

*" angir et varemærke som tilhører ConvaTec Inc.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες είναι ένα υλικό, απορροπώσιμο, μη υφαντό επιθεμα σπινθηρώσο από δύο στρώματα κεντροκέντρου κελυφώδους κατασκευής, περιτριφυμένο με 1,2% ιονισμένο αργόριο (αντιμικροβιακή ενίσχυση, ενισχυμένο με εθυλενοδιαμινοτετράεστες (EDTA) και βενζιμιδαζόλιο EDTA) και ένα υδροκίβητο βενδάνιο, και ενισχυμένο με ένα αναγεννητικό κεντροκέντρου.

Αυτό το επιθεμα απορροφά το εξίδρωμα και τα βακτήρια μετατρέποντάς σε ένα μαλακό gel που διατηρεί το υγρό περιβάλλον ενισχύοντας την αυτοκαθαίρεση ή που είναι αλληλεγγύη αντίδραση στον Άργουρο, στην Καρβουλοξυμολακταμίνη, το EDTA ή το Χλωριούχο Βενδάνιο.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΑΝΤΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΗΡΕΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΑΝΤΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΗΡΕΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

Όλα τα τραύματα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά. Απομονώστε το επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA Hydrofiber™ όταν ενδοκρινικά κινείται ή / και, άσπρη, σηματοδοτεί απορρόφηση αυθιμώμενη ή μετά από μεγάλο αριθμό ημερών.

ΑΝΤΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΗΡΕΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι, στον άκτιο (φωκίδες, αρθρίτιδα ή μυχία αποκαλύπτον και ένα κακώς καλυμμένο / μεμονωμένο πόδι).
- Χειρουργικών τραυμάτων.
- Πληγών με κυκλοφορητικό έλλειψη, όπως πληγές όπου έχουν αποκαταστήσει τα νεκρωτικά περιεχόμενα ή η χειρουργική.
- Ογκολογικά εξελκωτικά τραύματα όπως μολυσματικό καρκίνωμα, μεταστάσεις του επιθηλίου, οστεομακ Κaposi, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου.
- Μεμονωμένα τραύματα (βαθύτατα βαθύτα) εγκαυμάτων και περφόρδς όρι.
- Έκρη όπου το βακτήριο είναι το πιθανό αίτιο (ή παρόμοια) κρουσμάτων / μη διαβλητών.

ΑΝΤΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΗΡΕΣΕΙΣ

Το ενισχυμένο Υδροκίβητο επίθεμα AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ Hydrofiber™ με Άργουρο και ενισχυτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιποίηση των ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για τη διαχείριση:

- Τραυμάτων, ως αποδοτική πρόφηση στην εξάλειψη βακτηρίων που μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση.
- Τραυμάτων όπου υπάρχει μολυσμός ή υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης.
- Πληγών σε διαβητικό πόδι,